


**Abteilung für Operative Gynäkologie
Zentrum für minimal-invasive Chirurgie**

**Krankenhaus Sachsenhausen
Frankfurt am Main**

**Akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main**







Hysterektomie Komplikationen Urogenital-Trakt



Philipp-Andreas Hessler


**22. Jahrestagung der AGE
28.–30. April 2016 in Berlin.**


























HYSTEREKTOMIE & KOMPLIKATIONEN

Ureter-Läsion links nach TLH (2)














OP-Indikation: 49 Jahre, G3P2, Hyper- & Dysmenorrhoe bei Uterus myomatosus
OP: HSK, TLH + Salpingektomie bds. (425 Gramm)
Komplikation: 3. Tag post-OP Routine Nieren-Sono mit Harnstau 1,6 cm links
i.v. Py und CT Urogramm Harnstau III° rechts, Kalibersprung prävesikal









Vielen Dank !

phessler@khs-ffm.de

www.mic-zentrum-frankfurt.de

| Zeitpunkt | Schmerz | Drainage | Diagnostik | Diagnose | Therapie |
|------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| < 24 Std. | ∅ | ++++ (Aszites) | Kreatinin, US CT Urogramm | Scharfe Läsion Blase/Ureter | Blase: ∅ nach DK → CSK , ggf. LSK + Naht Ureter: → Doppel-J, ggf. LSK Revision |
| < 24 Std. | ++++ | ∅ | US: Nierenstau CT Urogramm | Ligatur Ureter | → LSK Revision (Naht) + ggf. Doppel-J |
| 1–5 Tage | + - +++ | (Aszites) | CRP, US !! CT Urogramm | Thermoläsion | Blase: ∅ nach DK → CSK , ggf. LSK + Naht Ureter: → Doppel-J, ggf. LSK Revision |
| 1–5 Tage | + - +++ | | CRP, US !! CT Urogramm | „Einengung“ (Ecknähte) | Ureter: → LSK Revision + Naht, ggf. Doppel-J |
| 2-4 Wochen | + - +++ | | CRP, US !! CT Urogramm | Thermoläsion | Blase: ∅ nach DK → CSK , ggf. LSK + Naht Ureter: → Doppel-J, ggf. LSK Revision |
| 1-5 Wochen | ∅ | Ausfluss (blutig) | CSK CT Urogramm | Vesico- oder Ureterovaginale Fistel | Blase: → LSK + Revision nach DK ≥ 1-2 Wo Ureter: → Doppel-J, Urologie Psoas-Hitch |



Vielen Dank !



phessler@khs-ffm.de
www.mic-frankfurt.de

